www.komipharm.com

자돈 설사병으로부터
안전하게 지키겠습니다



돼지전염성위장염, 로타바이러스(2종)
돼지유행성설사병 예방 복합생백신

프로백® 티알피

PRO-VAC® TRP


(주) 코미팜
Komipharm International Co., Ltd.

PRO-VAC® TRP

자돈설사

생산성 저하의 시작!

- 철저한 모돈백신접종을 통한 충분한 초유항체 이행만이 자돈설사병을 예방할 수 있습니다.



프로백® 티알피

4종 설사바이러스 예방백신


- 자돈의 주요 설사병 바이러스 4종이 함유된 생혼합백신입니다.
- 돼지전염성위장염(TGE), 돼지유행성설사(PED) 바이러스 및 2종의 로타바이러스(A1, 10)를 함유하였습니다.
- 4종 혼합백신으로 접종 스트레스를 최소화하였습니다.
- 4종 혼합백신으로 접종 프로그램이 보다 간편합니다.




프로백® 티알피

효능시험 자료


TGE virus




PED virus



ROTA (10)



ROTA (A1)



프로백® 티알피 대조군

프로백® 티알피 접종 모돈의 분만직후 혈청 및 초유 항체가 확인을 통한
높은 수준의 모체이행항체 형성확인

제품정보

■ **원료약품 및 분량** (2.0mL/두)

- 전염성위장염바이러스(TGE 175L주) ····· $10^{4.0}TCID_{50}$/ml이상
- 로타바이러스(A1주) ····· $10^{6.0}TCID_{50}$/ml이상
- 로타바이러스(10주) ····· $10^{6.0}TCID_{50}$/ml이상
- 돼지유행성설사병바이러스(SM98Pvac주) ····· $10^{4.5}TCID_{50}$/ml이상

■ **효능 및 효과**

TGE, Rota, PED 바이러스 감염에 의한 질병예방을 목적으로 사용

■ **용법 및 용량**

- 후보돈 및 경산돈의 이근부 또는 대퇴부 근육에 주사
- 후 보 돈 : 순치기간 중 2주간격으로 2.0ml을 2회 근육주사
- 경 산 돈 : 분만 5~4주전 1차, 3~2주전 2차를 2.0ml씩 근육주사

■ **주의사항**

- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용설명을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 제품에 대하여 문의사항이 있으실 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

■ **제품단위** : 5두분

건강한 자돈생산을 위한 확실한 방어

프로백® 설사예방 시리즈

프로백® 티알피

4종 설사바이러스 예방 혼합생백신

- 돼지전염성위장염바이러스
- 로타바이러스(2종)
- 돼지유행성설사바이러스



프로백® 티알

2종 설사바이러스 예방 혼합생백신

- 돼지전염성위장염바이러스
- 로타바이러스



프로백® 티피

2종 설사바이러스 예방 혼합불활화백신

- 돼지전염성위장염바이러스
- 돼지유행성설사바이러스



프로백® 피이디

돼지유행성설사 예방 생백신

- 돼지유행성설사바이러스



(주) 코미팜
Komipharm International Co., Ltd.
경기도 시흥시 정왕동 1236-6번지

제품 · 질병상담 : 080-498-0800

www.komipharm.com